



## 14 vaccins

### 12 Vaccins obligatoires

- Rougeole
- Oreillons
- Rubéole
- Diphtérie
- Tétanos
- Poliomyélite
- Coqueluche
- Hépatite B
- Pneumocoque
- Méningocoque B
- Méningocoque ACWY
- *Haemophilus influenzae b*

### 2 vaccins recommandés

- Papillomavirus
- Rotavirus

## Principales Maladies Prévenues




### Encéphalites

- Poliomyélite
- Tétanos
- Diphtérie
- Rougeole

### Méningites

- *Haemophilus influenzae b*
- Pneumocoque
- Méningocoque B et ACWY
- Oreillons



### Infections Respiratoires Sévères

- Coqueluche
- Diphtérie
- Pneumocoque
- Rougeole



### Cancers

- Hépatite B\* (foie)
- Papillomavirus (col de l'utérus, anus, gorge, bouche, pharynx)



### Infections du fœtus

- (Fausses-couches, malformations...)
- Rubéole
  - Oreillons



### Stérilité

- Oreillons

\* Également hépatites aiguës et chroniques, cirrhose

## Calendrier vaccinal\*

Vaccins <sup>a</sup>	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-14 ans
DTCaP	✓		✓			✓			✓	✓ <sup>b</sup>
Hib, HepB, PnC	✓		✓			✓				
Méningocoque ACWY					✓		✓			✓
Méningocoque B		✓		✓			✓			
ROR							✓	✓		
Papillomavirus										✓
Rotavirus	✓	✓	(✓) <sup>c</sup>							

<sup>a</sup> Acronymes : DTCPaP = Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite ; Hib = *Haemophilus influenzae b* ; PnC = pneumocoque ; ROR = rougeole, oreillons, rubéole ;

<sup>b</sup> DTCaP : entre 11 ans et 13 ans

<sup>c</sup> Rotavirus : 2 à 3 doses en fonctions des vaccins ;

\* Chez les prématurés les schémas sont adaptés. Une dose additionnelle de vaccin antipneumococcique est recommandée à 3 mois. En cas d'hospitalisation, il est recommandé d'administrer la première dose de vaccin hexavalent avant la sortie et de garder le nourrisson sous monitoring cardio-respiratoire pendant les 48 heures qui suivent.



## Pour les enfants non vaccinés, des rattrapages sont recommandés

Vaccin	Age
<i>Haemophilus influenzae</i> B	Entre 6 mois et 5 ans
Hépatite B	Jusqu'à 15 ans
Méningocoque ACWY	Entre 15 ans et 24 ans
Papillomavirus	Entre 15 ans et 19 ans

## 4 vaccins sont recommandés dans des contextes particuliers

Vaccin	Contexte	Age
Grippe	Risque grippe sévère <sup>a</sup>	A partir de 6 mois
COVID-19	Risque de COVID-19 sévère <sup>a</sup>	A partir de 6 mois
Tuberculose <sup>b</sup>	Risque de tuberculose	A 1 mois
Varicelle	Enfant n'ayant pas fait la varicelle	Entre 12 ans et 18 ans

<sup>a</sup> Maladie cardiaque, pulmonaire, rénale, neurologique...

<sup>b</sup> Non disponible en officine

## Retrouvez cette monographie et d'autres

